

# ATEN IE!

Pentru medicii care au în tratament pacien i cu Miastenia gravis

## Medicamente interzise în Miastenia gravis

A) *D-penicilamina nu trebuie utilizat*

*NICIODAT la pacien i cu miastenie*

B) *Urmatoarele medicamente produc agravarea miasteniei la majoritatea pacien ilor i trebuie evitate sau utilizate cu pruden i pacientul s fe atent monitorizat:*

1) *succinilcolina, d-tubocurarina, vercuronium*

*i al i agen i blocan i neuromusculari*

2) *chinina, chinidina i procainamida*

3) *unele antibiotice, în special: tobramicina, gentamicina, kanamicina, neomicina, streptomycină, colistin, eritromicina, ciprofoxacina, telitromicina*

4) *betablocantele: propranolol, timolol maleat pic turi pentru ochi*

5) *blocantele canalelor de calciu*

6) *substan ele de contrast iodate*

7) *magneziul i preparatele ce con in magneziu*

## Lista cu medicamentele ce pot agrava Miastenia Gravis

### I. Medicamente care pot exacerba miastenia sau evidenția o miastenie latentă

- Blocante neuromusculare: (curarizante, ex Vercuronium®)
- Excesul de anticolinestrazice: pyridostigmina (Mestinon®) sau neostigmina (Miostin®)
- Corticosteroizii i ACTH (Prednison, uneori la începutul tratamentului)
- Magneziu i preparatele ce con in magneziu
- Antiaritmice:
  - Lidocaina (Xilina) administrata intravenos ( local se poate administra fara riscuri)
  - Chinidina si preparatele pe baza de chinina
  - Procainamida (Pronestyl®)
- Fenitiona i medicamentele înrudite (ex. Dilantin®)
- Antibiotice
  - aminoglicozide (gentamicina, tobramicina, amikacina, neomicina, streptomycină, kanamicina)
  - polipeptide: polimixina, colimicina (Colistin)
  - miscelane (alte antibiotice) clindamicina, ciprofoxacina, eritromicina, telitromicina (KETEK®)

### II. Medicamente ce pot induce miastenia prin provocarea unei reacții autoimune

D-penicilamina (Cuprimine®)  
Trimetadiona (Tridione®)

### III. Medicamente implicate în agravarea miasteniei în cazuri izolate

Cimetidina (Tagamet®)  
Anestezice (inclusiv alcoolul)  
Chloroquina  
Cocaina  
Diazepam (Valium®)  
Lithium  
Propranolol  
Timolol maleat (Timoptic®) - picaturi pentru ochi  
Tetraciclinele:

- tetraciclina,
- chlortetraciclina,
- oxytetraciclina,
- demeclocyclina,
- doxycyclina (Vibramycin®),
- minocyclina

Trihexyphenidyl (Artane®)

**Important pentru pacienti:**

**Evitati automedicatia!**

**Consultati specialistul neurolog.**

Agravarea si biciunii la pacien ii miastenici a fost raportat i la alte medicamente. To i pacien ii cu Miastenia gravis trebuie urm ri i ori de câte ori se instituie o nou medica ie.

*Asocia ia Na ional*  
*Miastenia Gravis România*

Este o organiza ie non-profit, umanitar , ce are drept scop ap rarea drepturilor i intereselor persoanelor afectate de Miastenia Gravis i îmbun t irea calit ii vie ii acestora.

Ne propunem s realiz m aceste deziderate prin programe educa ionale, de reabilitare i recuperare, de informare i mediatizare a problematicii specifice bolnavilor miastenici, de preg tire a profesiunilor i de stimulare a cercet rii medicale în domeniu

*Asocia ia Na ional*  
*Miastenia Gravis România*

Str. G-ral. George Macarovici nr. 7, sector 6,  
cod 060142, Bucure ti, România

Tel: 0744 70 43 99; 031.4013830

Fax: 021.7603023

Email: asociatia.miastenia@gmail.com

**www.miastenie.ro**

Parteneri ai Euromyasthenia  
[www.euromyasthenia.org](http://www.euromyasthenia.org)

CIF: 18136030;

Nr. înreg. Registru special: 70/08.11.2005

IBAN: RO55BPOS71906938789RON01,

BancPost Bucuresti - Agentia Lizeanu



**Lista  
medicamentelor  
care pot agrava  
Miastenia Gravis**

Sursa materialului

Myasthenia Gravis Foundation of America MGFA

[http://www.myasthenia.org/hp\\_edmaterials.cfm](http://www.myasthenia.org/hp_edmaterials.cfm)

Healthcare Professionals: Educational Materials

Clinical News/alert: Myasthenia Gravis, 2008

**Material informativ cu scop educa ional**